УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

_____

_____ А.А.НЕПОКЛОНОВ

29 АПР 2014

_____

Инструкция
по применению Линкоспектина 100 водорастворимого порошка
для лечения бактериальных инфекций у свиней и цыплят

(организация-разработчик «Zoetis Inc.», США)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Линкоспектин 100 водорастворимый порошок (Linco-Spectin 100 soluble powder).

Международное непатентованное наименование: линкомицин и спектиномицин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Линкоспектин 100 водорастворимый порошок в 150 г содержит в качестве действующих веществ линкомицина гидрохлорида – 33,3 г и спектиномицина сульфата – 66,7 г, а в качестве вспомогательных веществ: бензоат натрия – 1,6 г и моногидрат лактозы – до 150 г.

По внешнему виду препарат представляет собой порошок белого цвета.

3. Препарат выпускают расфасованным в пластиковые банки по 150 г или 1,5 кг.

4. Линкоспектин хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0 °С до 25 °С. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения составляет 5 лет с даты производства. Срок годности открытой банки составляет 28 дней при соблюдении указанных условий хранения. Срок годности разведенного раствора составляет 24 часа с момента разведения. Запрещается применять препарат после истечения срока годности.

5. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Линкоспектин 100 водорастворимый порошок относится к комбинированным антибактериальным препаратам.

Линкомицин – одно из действующих веществ Линкоспектина 100 – антибиотик из группы линкозамидов, оказывающий бактериостатическое действие в отношении широкого спектра грамположительных аэробных и анаэробных микроорганизмов и микоплазмы. Линкомицин после орального введения обладает 50 % биодоступностью у

свиней и 100 % биодоступностью в организме птицы, выводится с фекалиями в неизменном виде, а также в виде метаболитов.

Спектиномицин, входящий в состав лекарственного препарата, является аминогликозидным антибиотиком. Оказывает бактериостатическое действие относительно широкого спектра грамотрицательных микроорганизмов и микоплазм.

Спектиномицин практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта при оральном применении, и выводится с фекалиями в неизменном виде.

Комбинация линкомицина и спектиномицина эффективна для лечения болезней бактериальной этиологии, вызываемых *Mycoplasma* spp., *Escherichia coli*, *Lawsonia intracellularis* и другими микроорганизмами, чувствительными к данным антибиотикам.

Препарат по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным соединениям (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

8. Линкоспектин 100 водорастворимый порошок применяют для лечения энтеритов бактериальной этиологии у свиней, а также с лечебной и с лечебно-профилактической целью при заболеваниях бактериальной этиологии у цыплят-бройлеров.

9. Запрещается применять препарат при индивидуальной повышенной чувствительности животных к его компонентам. Не назначать препарат курам-несушкам, яйца которых используют в пищу людям.

10. Линкоспектин 100 водорастворимый порошок применяют с лечебно-профилактической целью цыплятам-бройлерам в дозе 225 мг лекарственного порошка на 1 кг массы птицы в день (что соответствует 150 мг активного вещества: 50 мг линкомицина и 100 мг спектиномицина) в течение первых 3-5 дней жизни и 1-2 дней в возрасте 4 недель.

Для лечения цыплят Линкоспектин 100 водорастворимый порошок назначают в той же дозе при появлении первых клинических признаков заболевания, и продолжают в течение 3-7 дней, в зависимости от тяжести заболевания.

Таблица расчета количества Линкоспектина 100 водорастворимого порошка в граммах для приготовления раствора для 1000 птиц в день из расчета 150 мг антибиотика на 1 кг массы животного

Средняя масса птицы (г)	Количество Линкоспектина 100 (граммы) необходимое на 1000 птиц	Вода, л
40	9	12
100	22,5	30
200	45	60
500	112,5	150
1000	225	300
2000	450	600

Свиньям Линкоспектин 100 водорастворимый порошок назначают при появлении первых симптомов энтерита бактериальной этиологии в дозе 10 мг препарата на 1 кг массы животного в день (2,2 мг линкомицина и 4,4 мг спектиномицина) в течение 7 дней. Для этого необходимо содержимое банки (150 г) растворить в 1600 литрах питьевой воды. Препарат, растворенный в воде, должен быть единственным источником воды при проведении лечения.

11. Симптомы передозировки не установлены.

12. Особенностей действия при начале введения и отмене препарата не выявлено.

13. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы

необходимо ввести ее как можно скорее. Далее курс лечения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

14. При применении лекарственного средства в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическое лечение.

15. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не установлено.

16. Убой птицы проводят не ранее, чем через 5 суток после последнего применения препарата, а убой свиней на мясо проводят без ограничений. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения. При работе с препаратом запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы с препаратом следует вымыть руки водопроводной водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей и слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Линкоспектином. В случае проявления аллергической реакции или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

19. Пустую упаковку из-под лекарственного средства запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: “Zoetis Suzhou Manufacturing Co., Ltd.” No.180 Zhu Yuan Road, Suzhou New District, Suzhou 215011 PR, Китай

Инструкция разработана компанией «Zoetis Inc.» (100 Campus Drive , Florham Park, New Jersey, 07932 USA) совместно с ООО «Зоэтис».

Адрес ООО «Зоэтис» в РФ: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Линкоспектина 100 водорастворимого порошка, утверждённая Россельхознадзором 11 апреля 2012 года.

Рекомендовано к применению в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения: