SE A OPÇÃO É UMA QUINOLONA, A ESCOLHA É Ubiflox®

Marbofloxacina

zoetis™

PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS[1]

A Marbofloxacina apresenta um excelente perfil farmacocinético, que se caracteriza por:

- **CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA MÁXIMA SUPERIOR**



- **TEMPO DE SEMI-VIDA SUPERIOR**



- **BIODISPONIBILIDADE (AUC) SUPERIOR**



INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

- Infecções de pele e tecidos moles
- Infecções de trato urinário
- Infecções de trato respiratório

- Infecções de pele e tecidos moles
- Infecções de trato respiratório superior

POSOLOGIA E APRESENTAÇÕES

24h

2 MG/KG UMA VEZ AO DIA

3 APRESENTAÇÕES COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES

COMPRIMIDOS FACILMENTE FRACCIONÁVEIS

COMPRIMIDOS PALATÁVEIS COM SABOR A CARNE

Ubiflox®
Marbofloxacina

SE A OPÇÃO É UMA QUINOLONA, A ESCOLHA É Ubiflox®

Marbofloxacina

- **APRESENTA UM EXCELENTE PERFIL FARMACOCINÉTICO**
- **COMBATE AS INFECÇÕES MAIS FREQUENTES EM CÃES E GATOS**
- **DISPONÍVEL EM 3 APRESENTAÇÕES**

Ubiflox 5mg comprimidos para gatos e cães (AIM 635/01/12DFVPT) Ubiflox 20 mg comprimidos para cães (AIM 635/02/12DFVPT) Ubiflox 80 mg comprimidos para cães (AIM 635/03/12DFVPT) Cada comprimido contém: Marbofloxacina 5 mg, 20 mg ou 80 mg. Comprimidos marmoreados de cor clara amarela acastanhada, redondos, biconvexos, com bordos biselados, e manchas pretas e brancas, ranhurados num dos lados. Os comprimidos podem ser divididos em metades. Indicações Tratamento das infeções provocadas por estirpes de microrganismos sensíveis à marbofloxacina.Em cães: infeções da pele e dos tecidos moles (intertrigo, impetigo, foliculite, furunculose, celulite); infeções do trato urinário (ITU) associadas ou não a prostatites ou epididimites; infeções do trato respiratório. Em gatos: infeções da pele e dos tecidos moles (feridas, abcessos, fleimões); infeções do trato respiratório superior. Contraindicações Não administrar a cães com menos de 12 meses de idade, ou com menos de 18 meses de idade para as raças de cães excecionalmente grandes com um longo período de crescimento, como os Great Danes, Briard, Bernese, Bouvier e Mastiffs.Não administrar a gatos comprimidos de 20 mg ou 80 mg. Para o tratamento desta espécie estão disponíveis os comprimidos de 5 mg. Não administrar a gatos com menos de 16 semanas de idade. Não administrar em caso de hipersensibilidade conhecida à marbofloxacina, ou outras (fluoro)quinolonas ou a algum dos excipientes do medicamento veterinário. Advertências especiais Um pH urinário baixo pode ter um efeito inibitório da atividade da marbofloxacina. A piodermatite surge secundariamente a uma doença subjacente; como tal, é aconselhável determinar a causa subjacente e tratar o animal de acordo com a mesma.Precauções especiais para utilização em animais Doses elevadas de algumas fluoroquinolonas podem ter um potencial epileptógenico. A marbofloxacina deve ser usada com prudência em cães e gatos com historial clinico de epilepsia. Contudo, a administração da dose terapêutica recomendada não desencadeia efeitos secundários graves em cães e gatos. Em particular, não foram observadas lesões articulares em estudos clínicos com a dose recomendada. Deverão ser tomadas em consideração as normas antimicrobianas locais e oficiais durante a administração do medicamento veterinário.As fluoroquinolonas devem ser reservadas para o tratamento de situações clínicas que tenham respondido mal ou se espere que respondam mal a outras classes de antimicrobianos.Sempre que possível, a utilização das fluoroquinolonas deve ser baseada em testes de sensibilidade. A utilização deste medicamento veterinário fora das indicações do RCMV pode aumentar a prevalência da resistência bacteriana às (fluoro)quinolonas e diminuir a eficácia do tratamento com outras quinolonas devido ao potencial para resistência cruzada. Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais As pessoas com hipersensibilidade conhecida às (fluoro)quinolonas devem evitar o contacto com este medicamento veterinário. Em caso de ingestão acidental consultar imediatamente um medico e mostrar-lhe o rótulo e/ou o folheto informativo do medicamento veterinário. Lavar as mãos após a administração. Reações adversas Podem ocorrer efeitos secundários moderados como vómito, amolecimento das fezes, alterações da sede ou aumento transitório da atividade. Estes sinais desaparecem espontaneamente após o tratamento e não é necessária a interrupção do tratamento. Utilização durante a gestação e lactação Os estudos realizados em animais de laboratório (rato, coelho) não revelaram embriotoxicidade, teratogenicidade e maternotoxicidade com a dose terapêutica da marbofloxacina. Contudo, não foram realizados estudos específicos em gatas e cadelas gestantes ou lactantes. Portanto, nestas categorias de animais, administrar apenas em conformidade com a avaliação benefício/risco realizada pelo médico veterinário responsável. Interações medicamentosas e outras formas de interação As fluoroquinolonas interatuam com catiões administrados por via oral (Alumínio, Cálcio, Magnésio, Ferro). Nestes casos, a biodisponibilidade da marbofloxacina pode estar reduzida. A administração concomitante de medicamentos à base de teofilina pode conduzir à inibição da eliminação da teofilina. Posologia e via de administração Para administração oral. A dose recomendada é de 2 mg/kg /dia numa única dose diária: 1 comprimido de 5 mg por 2,5 Kg de peso corporal; 1 comprimido de 20 mg por 10 Kg de peso corporal; 1 comprimido de 80 mg por 40 Kg de peso corporal. Quando necessário e exclusivamente em cães, a administração da combinação de comprimidos, inteiros ou metades, de diferentes dosagens (5 mg, 20 mg ou 80 mg) permite uma dosagem exata. De forma a garantir a dosagem correta, o peso corporal deve ser determinado da forma mais exata possível para evitar a subdosagem. Duração do tratamento Cães: nas infeções da pele e dos tecidos moles, a duração do tratamento é de pelo menos 5 dias, podendo prolongar-se até 40 dias. Nas infeções do trato urinário, a duração do tratamento é de pelo menos 10 dias, podendo prolongar-se até 28 dias. Nas infeções respiratórias, a duração do tratamento é de pelo menos 7 dias, podendo prolongar-se até 21 dias. Gatos: nas infeções da pele e dos tecidos moles (feridas, abcessos, fleimões), a duração do tratamento é de 3 a 5 dias. Nas infeções respiratórias superiores, a duração do tratamento é de 5 dias. Sobredosagem A sobredosagem pode provocar sinais de alterações neurológicas graves que devem ser tratadas sintomaticamente. Intervalo de segurança Não aplicável. Grupo farmacoterapêutico: Antibacterianos para uso sistémico, Fluoroquinolonas. Código ATCVet: QJ01MA93 Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 2 anos. Prazo de validade de meio comprimido: 5 dias. Conservar na embalagem de origem para proteger da luz. A conservação deste medicamento veterinário não requer condições especiais de temperatura. Embalagens de 10 comprimidos e de 100 comprimidos (dosagens de 5 mg e 20 mg). Embalagens de 12 comprimidos e de 72 comprimidos (dosagem de 80 mg). É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor. Titular da AIM: KRKA, d.d. Eslovénia Representante local: Zoetis Portugal, Lda Lagoas Park, Ed 10 2740-271 Porto Salvo. AIM em 19 de Dezembro de 2012.

Referências

1. HEINEN E. Comparative serum pharmacokinetics of the fluoroquinolones enrofloxacin, difloxacin, marbofloxacin, and orbifloxacin in dogs after single oral administration. J. Vet. Pharmacol. Therap. 25, 1-5, 2002.

SLUBIFT 1309001

VetPartner®

zoetis™