

Cazitel *Plus* XL

Livre de parasitas, livre de preocupações



zoetis™

Cazitel Plus XL

Livre de parasitas, livre de preocupações



- **Controla os parasitas gastrointestinais mais frequentes**
- **Combate adultos e também formas imaturas de céstodes e nemátodes**
- **Embalagens de 50 comprimidos**
- **1 comprimido por cada 35kg**
- **Comprimidos fraccionáveis para maior flexibilidade**
- **Comprimidos palatáveis para maior conveniência**

Cazitel Plus XL Comprimidos para cães. Cada comprimido contém: Substâncias ativas: Praziquantel 175 mg, Embonato de Pirantel, 504 mg (equivalente a 175 mg de pirantel), Febantel 525 mg. Espécie(s) alvo: Caninos (cães). Indicações: Em cães adultos: Tratamento de infecções mistas de nemátodos e céstodos das seguintes espécies: Nemátodos: Ascarídeos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (formas adulta e imatura tardia), Ancilostomídeos: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adultos), Tricurídeos: *Trichuris vulpis* (adultos), Céstodos: Espécies de *Echinococcus*, (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), espécies de *Taenia*, (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*), *Dipylidium caninum* (formas adultas e imaturas). Contraindicações: Não administrar simultaneamente com compostos piperazínicos. Não administrar a animais com conhecida sensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Advertências: As pulgas são hospedeiros intermediários de um céstodo comum – *Dipylidium caninum*. A reinfestação por céstodos irá ocorrer caso não sejam tomadas medidas de controlo dos hospedeiros intermediários, tais como pulgas, ratos, etc. Os parasitas poderão desenvolver resistência a uma determinada classe de anti-helmínticos após a administração frequente e repetida de um anti-helmíntico dessa classe. Precauções especiais de utilização: Para assegurar a administração da dose correta, o peso corporal deverá ser determinado da forma mais exata possível. Em caso de ingestão accidental, dirija-se a um médico e mostre-lhe o folheto informativo. Por medidas de higiene, as pessoas que administram os comprimidos diretamente ao cão, ou que os adicionam à comida do cão, devem lavar as mãos depois de manusear os comprimidos. Reações adversas: Desconhecidas. Utilização durante a gestação, a lactação e a postura de ovos: Foram relatados efeitos teratogénicos em ovelhas e ratos atribuídos a doses elevadas de febantel. Não foram realizados estudos em cães durante o início da gestação. Durante a gestação administrar o medicamento veterinário apenas em conformidade com a avaliação benefício/risco realizada pelo médico veterinário responsável. Recomenda-se a não administração do medicamento veterinário em cães durante as primeiras 4 semanas de gestação. Não exceder a dose recomendada aquando do tratamento de cadelas gestantes. Interações: Não administrar simultaneamente com compostos piperazínicos, uma vez que pode existir antagonismo entre os efeitos anti-helmínticos do pirantel e da piperazina. A administração concomitante com outros compostos colinérgicos pode conduzir a toxicidade. Posologia e via de administração: Exclusivamente para administração oral. As doses recomendadas são: 15mg de febantel /kg de peso corporal, 5 mg de pirantel/kg de peso corporal (equivalente a 14,4 mg de embonato de pirantel/kg) e 5 mg de praziquantel /kg. Isto é equivalente a 1 comprimido do medicamento veterinário por 35 kg de peso corporal. Em cães com mais de 35 Kg de peso corporal deve ser administrado 1 comprimido do medicamento veterinário em conjunto com a quantidade apropriada de Cazitel Plus comprimidos, equivalente a 1 comprimido por cada 10 Kg de peso corporal. Em cães com peso corporal próximo dos 17,5 Kg, deve ser administrado ½ do medicamento veterinário. Os comprimidos podem ser administrados diretamente ao cão ou misturados com os alimentos. Não são necessárias medidas de jejum antes ou após o tratamento. Em caso de risco de reinfestação, o médico veterinário deverá avaliar a necessidade e frequência de administração subsequente. Sobredosagem: A associação de praziquantel, embonato de pirantel e febantel é bem tolerada em cães. Em estudos de segurança, uma dose única 5 vezes superior à dose recomendada causou vômitos ocasionais. Incompatibilidades: Não aplicável. Prazo de validade: Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 3 anos. Os comprimidos fracionados não utilizados devem ser administrados no prazo de 14 dias. Precauções especiais de conservação: Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. De cada vez que um comprimido fracionado não é administrado, deve ser colocado no blister correspondente e inserido dentro da caixa de cartão. Colocar o blister na caixa de cartão. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited, Loughrea, Co. Galway, Irlanda. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: 216/02/12RFVPT